ЦЕНТР ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

ООО «ЦЭХ»
630007, г. Новосибирск,
ул. Фабричная, 4/1
тел.: +7 383 383 5503,
+7 383 383 6003
gastroexpert54@yandex.ru

ИНН 5406828073 КПП 540601001 ОГРН 1225400051821
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 045004641 к/с 30101810500000000641 р/с 40702810544050005824

Комплекс исследований
Для проведения процедур под АНЕСТЕЗИЕЙ
(с в/в – пропофол)
ПОСЛЕ АНЕСТЕЗИИ за РУЛЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!

По достижению возраста 60+ консультация нашего анестезиолога ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!

№ п/п	Исследование	Срок годности
1.	Развернутый (общий) анализ крови (*ОАК + СОЭ + лейкоцитарная формула*)	14 дней
2.	Протромбин (по Квику)+МНО+Фибриноген +АЧТВ	14 дней
3.	Глюкоза	14 дней
4.	Группа крови+резус фактор	-
5.	ЭКГ с расшифровкой	30 дней
6.	ФЛГ (или Rg-графия, или МСКТ (КТ)ОГК)	1 год

7. При сопутствующих заболеваниях: **сердечнососудистой системы**, **сахарный диабет,** необходимо заключение **кардиолога / эндокринолога.**
8. Консультация терапевта **после всех обследований** с выдачей справки.
9. При наличии **факторов риска тромбозов–компрессионные чулки первого класса компрессии.**

ВНИМАНИЕ! Компрессионные чулки нужно надеть в день исследования утром сразу после сна, не вставая с постели.

Факторы риска тромботических осложнений:

- Возраст 40 лет и старше;
- Наличие в анамнезе ТЭЛА и других тромбоэмболических осложнений;
- Наличие варикозного расширения вен нижних конечностей;
- Наличие сердечной недостаточности;
- Наличие онкологического заболевания;
- Наличие ожирения;
- Наличие острого инфекционного заболевания;
- Наличие паралича/пареза нижних конечностей;
- Наличие тромбофилии;
- Наличие миелопролиферативного заболевания;
- Предшествующий постельный режим более 4 дней (для маломобильных пациентов);
- Послеродовой период (до 6 недель после родов);
- Прием препаратов эстрагена;
- Резистентность к активному протеину С.

Внимание: Если пациент принимает антикоагулянты, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** отменить и проинформировать лечащего врача!

1. КЛОПИДОГРЕЛ (за 5дней отменить)
2. ТИКЛОПИДИН (за 10 дней отменить)
3. ТИКАГРЕЛОР (за 7 дней отменить)
4. АСПИРИН (за 2 дня отменить)
5. КЛЕКСАН, ФЛАГМИН, ФРАКСИПАРИН, ЦИБОР(за 12 часов отменить)
6. КСАРЕЛТО, ЭЛИКВИС, ПРОДАКСА (за 24 часа отменить)
7. ВАРФАРИН (за 4-5 дней отменить)

г. Новосибирск, ул.Фабричная 4/1, ООО "ЦЭХ"
При себе иметь: паспорт, СНИЛС, результаты анализов, сменную одежду для процедуры.